



## Pargos ou Capatões?

São frequentemente desembarcadas 3 espécies de Pargos e 2 de Capatões que podem ser facilmente confundíveis. Os pargos distinguem-se dos capatões por apresentarem dentes caninos e molares enquanto que os capatões só têm dentes caninos.



## Pargos

O Pargo-legítimo apresenta as pontas da barbatana caudal brancas. O Pargo-sêmola apresenta uma mancha negra no opérculo e o Pargo-ruço apresenta pontos azuis no dorso e nos flancos e uma mancha escura na parte posterior da barbatana dorsal.




Nome Comum: Pargo-legítimo

Nome Científico: *Pagrus pagrus*

Código FAO: **RPG**

Outras características: Raios da barbatana dorsal curtos; banda transversal na cabeça vermelha escura, esta característica é pouco fiável uma vez que nem sempre está presente.




Nome Comum: Pargo-sêmola

Nome Científico: *Pagrus auriga*

Código FAO: **REA**

Outras características: Terceiro, quarto e quinto raios da barbatana dorsal muito longos, bandas transversais vermelhas escuras alternadas largas e estreitas, estas características são mais notórias nos juvenis desvanecendo-se com o crescimento do peixe.



Nome Comum: Pargo-ruço


Nome Científico: *Pagrus caeruleostictus*

Código FAO: **BSC**

Outras características: Mancha vermelha escura na parte posterior da barbatana dorsal; terceiro, quarto e quinto raios da barbatana dorsal longos, esta característica é mais notória nos juvenis desvanecendo-se com o crescimento do peixe.

## Capatões

O Capatão-de-bandeira apresenta uma mancha escura atrás da base da barbatana dorsal e o Capatão-legítimo não.




Nome Comum: Capatão-de-Bandeira

Nome Científico: *Dentex gibbosus*

Código FAO: **DEP**

Outras características: Mancha escura na base da barbatana peitoral; barbatana caudal orlada a negro; Terceiro e quarto raios da barbatana dorsal muito longos, esta característica está presente nos juvenis desaparecendo nos adultos. Os machos adultos apresentam uma protuberância na cabeça.



Nome Comum: Capatão-legítimo


Nome Científico: *Dentex dentex*

Código FAO: **DEC**

Outras características: Apresenta a cabeça mais pontiaguda que o Capatão-de-bandeira; apresenta pontos escuros no dorso e nos flancos.

## Outras espécies que podem ser confundidas

O Capatão-das-Canárias é uma espécie que ocorre raramente em Portugal, especialmente no sul do país. Pode ser confundida facilmente com o Capatão-de-bandeira, uma vez que ambas apresentam mancha escura na base da barbatana peitoral e barbatana caudal orlada a negro.



Nome Comum: Capatão-das-Canárias


Nome Científico: *Dentex canariensis*

Código FAO: **DEN**

Outras características: Mancha escura na base da barbatana peitoral

Enquanto que o Capatão-das-Canárias apresenta uma mancha vermelho escura na base da barbatana dorsal que se prolonga até aos raios, o Capatão-de-bandeira apresenta uma mancha preta situada somente atrás da base da barbatana dorsal.

A Bica pode ser confundida com as espécies anteriores, distinguindo-se destas por apresentar a cabeça muito pontiaguda e o bordo do opérculo vermelho. A sua dentição é composta por dentes caninos e molares.



Nome Comum: Bica

Nome Científico: *Pagellus erythrinus*

Código FAO: **PAC**