



Instituto Português
do Mar e da Atmosfera

Previsão Multi-Modelo C3S - Copernicus

Previsão para janeiro, fevereiro e março de 2024

Data de Referência: 01/01/2024

Conteúdo:

02 – Fevereiro, março e abril

03 – Como interpretar

Resumo:

Na **precipitação total mensal**, prevê-se **anomalia positiva, 5 a 10mm**, no mês de fevereiro para o interior da região Norte e sobre os Açores. Para os meses de **março e abril** não existe sinal significativo sobre Portugal Continental, Madeira e Açores

Na **temperatura média mensal do ar** prevê-se **anomalia positiva** sobre todo o território de Portugal continental e ilhas para os 3 meses abrangidos pela previsão.

Sobre Portugal Continental e Açores a anomalia é de **0.5 a 1.0°C** para os três meses com exceção da faixa litoral a norte do Tejo que apresenta anomalia de **0.25 a 0.5°C** no mês de março.

No arquipélago da Madeira a anomalia mantém-se de **1.0 a 1.5°C** nos três meses da previsão.

Produzido por:

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., com base nas previsões do ECMWF.


Disponível em: www.ipma.pt

A previsão mensal é baseada nas anomalias mensais.


A sua utilização deve ser feita com reservas declinando o IPMA quaisquer responsabilidades que resultem da sua utilização sem atender a estas reservas

FEVEREIRO

C3S_Multisystem (ECMWF UKMO MeteoFrance DWD CMCC NCEP JMA)
 Anomalia Mensal da Precipitação Acumulada
 Previsão de 20240101, disponível em 20240114, válida para 202402



C3S_Multisystem (ECMWF UKMO MeteoFrance DWD CMCC NCEP JMA)
 Anomalia Mensal da Temperatura a 2 metros
 Previsão de 20240101, disponível em 20240114, válida para 202402




**Anomalia positiva, 5 a 10mm, sobre a região Norte interior de Portugal Continental e sobre os Açores.
 Sem sinal significativo sobre a Madeira.**


Anomalia positiva, 0,5 a 1,0°C sobre o Continente e Açores, 1,0 a 1,5°C sobre a Madeira.

MARÇO

C3S_Multisystem (ECMWF UKMO MeteoFrance DWD CMCC NCEP JMA)
 Anomalia Mensal da Precipitação Acumulada
 Previsão de 20240101, disponível em 20240114, válida para 202403



C3S_Multisystem (ECMWF UKMO MeteoFrance DWD CMCC NCEP JMA)
 Anomalia Mensal da Temperatura a 2 metros
 Previsão de 20240101, disponível em 20240114, válida para 202403




Sem sinal significativo sobre Portugal continental, Madeira e Açores.


Anomalia positiva, 0,25 a 1,0°C sobre o Continente, 0,5 a 1,0°C sobre os Açores e 1,0 a 1,5°C sobre a Madeira.

ABRIL

C3S_Multisystem (ECMWF UKMO MeteoFrance DWD CMCC NCEP JMA)
 Anomalia Mensal da Precipitação Acumulada
 Previsão de 20240101, disponível em 20240114, válida para 202404



C3S_Multisystem (ECMWF UKMO MeteoFrance DWD CMCC NCEP JMA)
 Anomalia Mensal da Temperatura a 2 metros
 Previsão de 20240101, disponível em 20240114, válida para 202404



Sem sinal significativo sobre Portugal continental, Madeira e Açores.

Anomalia positiva, 0,5 a 1,0°C sobre o Continente e Açores, 1,0 a 1,5°C sobre a Madeira.

Como interpretar:

O boletim de previsão sazonal baseia-se, a partir de outubro de 2019 e em substituição do sistema de previsão EUROSIP, nas previsões multi-modelo disponibilizadas pelo Copernicus Climate Change Service (C3S). A previsão sazonal do C3S é atualizada mensalmente, ao dia 10, e cobre os 6 meses seguintes dos quais apenas os primeiros 3 são avaliados neste boletim. Os valores médios mensais no ensemble dos vários modelos são calculados no IPMA e elaboradas as cartas correspondentes.

A previsão sazonal do C3S, da mesma forma que a previsão EUROSIP, é uma previsão de ensemble implementada pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) que combina as contribuições de vários serviços meteorológicos de referência, no caso do C3S: O ECMWF, o serviço meteorológico inglês (Met Office), o serviço meteorológico francês (Météo-France), o serviço meteorológico alemão (DWD), o Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC) e o serviço meteorológico norte-americano (NCEP).

A criação de um sistema de previsão multi-modelo justifica-se pelos resultados da investigação nesta área que mostraram que combinando os resultados de vários modelos é possível obter uma previsão mais consistente e de maior confiança.

A razão fundamental para os bons resultados da abordagem multi-modelo, em comparação com os resultados obtidos individualmente por vários modelos, prende-se com o facto de todos os modelos possuírem erros com amplitude suficiente para que não exista uma degradação significativa das previsões quando integrados à escala sazonal.

Comparando com a previsão a médio-prazo a amplitude dos sinais previstos é, para as previsões sazonais, muito inferior e o intervalo temporal sobre o qual se acumulam os erros é muito superior. Apesar dos erros existentes em todos os modelos, a sua amplitude e o seu impacto numa dada previsão é diferente de modelo para modelo. Ao se efetuarem médias sobre um determinado número de modelos pode-se assim eliminar uma parte significativa do erro obtendo melhores previsões. Esta solução, apesar de útil, não é, no entanto, totalmente eficaz uma vez que alguns erros são comuns a vários modelos.

Para mais informação consultar:

<https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/Seasonal+forecasts+and+the+Copernicus+Climate+Change+Service>