

Boletim Previsão – Continente



**Previsão alargada para as próximas 4 semanas
no período de**

13/01 a 09/02/2025

Data de referência: 08/01/2025

Conteúdos:

- 02 – 1ª Semana (13/01 a 19/01)
- 02 – 2ª Semana (20/01 a 26/01)
- 03 – 3ª Semana (27/01 a 02/02)
- 03 – 4ª Semana (03/02 a 09/02)
- 04 – Como Interpretar

Produzido por:

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., com base nas previsões do ECMWF.

Disponível em:

www.ipma.pt

Resumo:

Na **precipitação total semanal**, prevêem-se valores **abaixo** do normal (-30 a -1 mm) para todo o território na 1ª semana (de 13/01 a 19/01). Nas 2ª, 3ª e 4ª semanas (de 20/01 a 26/01, de 27/01 a 02/02 e de 03/02 a 09/02) não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.


Na **temperatura média semanal**, prevêem-se valores **acima** do normal para todo o território, com um valor de +1 a 3°C na 2ª semana (de 20/01 a 26/01), com um valor de +0.25 a 3°C na 3ª semana (de 27/01 a 02/02) e com um valor de +0.25 a 1°C na 4ª semana (de 03/02 a 09/02). Na 1ª semana (de 13/01 a 19/01) não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.

A previsão alargada apresenta cenários em termos probabilísticos.


A sua utilização deve ser feita com reservas, para a 2ª e em especial para as 3ª e 4ª semanas, declinando o IPMA quaisquer responsabilidades que resultem da sua utilização sem atender a estas reservas.

Análise – 1ª Semana (13/01 a 19/01):

ECMWF - Anomalia Semanal da precipitação total
Previsão de 20250108, válida para semana de 20250113 00H00 a 20250120 00h00



ECMWF - Anomalia Semanal da Temperatura a 2 metros
Previsão de 20250108, válida para semana de 20250113 00H00 a 20250120 00h00




Precipitação Total Semanal: Anomalia **negativa** (-30 a -1 mm) para todo o território, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da precipitação total semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre 70-80%.


Temperatura Média Semanal: Não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.

Análise – 2ª Semana (20/01 a 26/01):

ECMWF - Anomalia Semanal da precipitação total
Previsão de 20250108, válida para semana de 20250120 00H00 a 20250127 00h00



ECMWF - Anomalia Semanal da Temperatura a 2 metros
Previsão de 20250108, válida para semana de 20250120 00H00 a 20250127 00h00




Precipitação Total Semanal: Não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.


Temperatura Média Semanal: Anomalia **positiva** (+1 a 3°C) para todo o território, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 60-90%.

Análise – 3ª Semana (27/01 a 02/02):

ECMWF - Anomalia Semanal da precipitação total
Previsão de 20250108, válida para semana de 20250120 00H00 a 20250127 00h00



ECMWF - Anomalia Semanal da Temperatura a 2 metros
Previsão de 20250108, válida para semana de 20250127 00H00 a 20250203 00h00




Precipitação Total Semanal: Não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.


Temperatura Média Semanal: Anomalia **positiva** (+0.25 a 3°C) para todo o território, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 40-70%.

Análise – 4ª Semana (03/02 a 09/02):

ECMWF - Anomalia Semanal da precipitação total
Previsão de 20250108, válida para semana de 20250127 00H00 a 20250203 00h00



ECMWF - Anomalia Semanal da Temperatura a 2 metros
Previsão de 20250108, válida para semana de 20250203 00H00 a 20250210 00h00



Precipitação Total Semanal: Não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.

Temperatura Média Semanal: Anomalia **positiva** (+0.25 a 1°C) para todo o território, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 40-70%.

Como Interpretar:

A previsão alargada tem como base o modelo do Centro Europeu de Previsão a Médio Prazo (ECMWF) que resulta da combinação de características da previsão a médio prazo (até 10 dias) com características das previsões sazonais. Esta combinação baseia-se no pressuposto de que um período de tempo de 10 a 30 dias é suficientemente curto para que a atmosfera retenha informação sobre as condições iniciais e é suficientemente longo para que a variabilidade do oceano influencie a circulação atmosférica.

A previsão alargada é efetuada com 101 membros do *ensemble*, sendo a climatologia que serve de base obtida com 90 membros para os últimos 20 anos.

As previsões alargadas baseiam-se essencialmente na análise das anomalias médias no *ensemble* e da distribuição de probabilidades para os parâmetros precipitação e temperatura do ar a 2m.

As anomalias representam médias das diferenças entre os resultados obtidos por cada membro do *ensemble* e a climatologia do modelo (média nos últimos 20 anos) e indicam valores acima (anomalias positivas) ou abaixo (anomalias negativas) do normal (climatologia).

As anomalias são acompanhadas de um teste estatístico que compara as distribuições de probabilidade do *ensemble* de cada previsão alargada e da climatologia. Nas regiões onde a significância estatística é inferior a 90%, diz-se que a anomalia não é estatisticamente significativa, ou seja, que a previsão não é conclusiva.

A distribuição de probabilidades indica se há maior ou menor concordância entre os membros do *ensemble* e permite associar um grau de confiança à previsão. Se todos os membros do *ensemble* apontarem para um determinado cenário, a probabilidade a ele associada é maior e a confiança na previsão é maior. Se existir uma grande dispersão dos membros do *ensemble* pelos vários cenários possíveis, a probabilidade associada a cada cenário é menor e a confiança na previsão é menor.

A previsão alargada corresponde a um produto em fase de desenvolvimento e apresenta cenários em termos probabilísticos. A sua utilização deve ser feita com reservas, em especial para a 2ª, 3ª e 4ª semanas, em que não existe aptidão da previsão para os padrões de tempo de larga escala e o erro da previsão é igual ao de uma previsão baseada numa média climatológica.

Quando, na análise dos tercis, se quantifica a probabilidade de ter valores superiores ou inferiores ao normal deve-se interpretar “normal” como pertencendo ao intervalo entre 33% e 66%, ou seja, inferior ao normal significa inferior a 33%, superior ao normal significa superior a 66%.